

Rezidențiat · 15 noiembrie 2020

# Subiecte rezidențiat 2020 medicină dentară: primele 20 de întrebări

Primele 20 de întrebări din caietul de concurs, din pozele candidaților.

Toate cele 200 de întrebări, cu grila oficială și explicații, gratuit

potide10.ro/rezidentiat/subiecte-dentara-2020/

## COMPLEMENT SIMPLU: 1-50 · COMPLEMENT MULTIPLU: 51-200

1. Antibioticele folosite mai frecvent, pentru administrarea pe cale generală, în tratamentul parodontitelor sunt:
   - A Tetraciclinele, în infecțiile în care predomină Porphyromonas gingivalis
   - B Metronidazolul, în infecțiile în care predomină Aggregatibacter Actinomycetemcomitans
   - C Azitromicina, în infecțiile cu Fusobacterium nucleatum
   - D Tetraciclinele, în infecțiile în care predomină Aggregatibacter Actinomycetemcomitans
   - E Azitromicina, în infecțiile cu Eiknella corrodens

2. În gangrena simplă:
   - A gelatinaza este eliberată de stafilococ
   - B necrotoxina este eliberată de stafilochinază
   - C sulfatazele sunt eliberate de bacteroides
   - D proteazele sunt eliberate de coci gram negativi
   - E condroitin sulfataza are rol de distrucție celulară

3. În apariția dinților supranumerari este contraargument al teoriei celei de-a treia dentiții:
   - A erupția dintelui supranumerar în poziție orală
   - B apariția dintelui supranumerar cu mineralizare tardivă și defectuoasă față de a dinților permanenți
   - C prezența mugurilor accesorii pe preparate histologice
   - D varietate mare a dinților supranumerari
   - E apariția dinților supranumerari cu grad de calcifiere similar celor din seria normală

4. După Zarnea, în gangrena dinților temporari, este complicație nespecifică simptomatică:
   - A parodontita apicală cronică
   - B adenitele
   - C infecția de focar
   - D extinderea proceselor inflamatorii și supurative în lojele feței sub formă de celulită sau abces
   - E parodontita apicală acută

5. În tratamentul afectării gingivo-osoase de gradul II, a bifurcațiilor și trifurcațiilor dinților laterali, cele mai bune rezultate se obțin prin:
   - A chiuretaj subgingival
   - B gingivectomie
   - C combinarea tehnicilor de regenerare tisulară ghidată și de adiție
   - D debridare gingivală, detartraj
   - E bioterapia de reactivare

6. Resturile epiteliale ale lui Malassez:
   - A apar datorită fragmentării lente a porțiunii radiculare a tecii Hertwig
   - B persistă în grosimea spațiului periodontal sub formă de celule izolate
   - C sunt în număr de 4 până la 20
   - D sunt în număr mai mare la indivizii în vârsta
   - E nu determină chisturi periapicale

7. Antibioterapia în tratamentul alveolitei umede se indică atunci când:
   - A chiuretajul local nu este posibil
   - B pacientul se prezintă la 2-3 zile după extracție
   - C plaga postextracțională este suturată
   - D apare o reacție febrilă
   - E dintele extras prezintă o reacție apicală cronică

**8** Teoria proterogenetică precizează ca etapă în dispariția filogenetică a unui dinte:
- A existența compensatorie a unui dinte supranumerar în alt sector al arcadei
- B reincluzia treptată a dintelui temporar corespunzător
- C microdonția dinților vecini
- D trecerea de la monoradiculație la biradiculație
- E încorporarea parțială a dintelui în cauză de către un dinte vecin

**9** După McCracken, axa de inserție a unei proteze parțiale mobilizabile scheletate se definește ca fiind:
- A bisectoarea unghiului format de axele dinților limitrofi edentației
- B direcția de mișcare a unei proteze mobile de la contactul inițial al părților ei rigide cu dinții de sprijin spre poziția de repaus terminal
- C linia ecuatorului protetic
- D acea axă de inserție care poate fi aleasă în funcție de zonele de retenție ale modelului
- E acea axă de inserție care trebuie să fie întotdeauna verticală, în timp ce planul de ocluzie al modelului se orientează cu înclinare antero-posterioară de 30 grade față de orizontală

**10** Croșetul pensă mezio-distală cu dublă extremitate liberă, din cadrul celei de a doua categorii a sistemului Roach, prezintă:
- A un conector secundar situat interdentar
- B un conector secundar situat pe fața linguală a dintelui
- C două prelungiri orizontale ce îmbrățișează fețele orale ale celor doi dinți pe care se aplică
- D un braț retentiv în formă de Y
- E un braț retentiv cu o singură extremitate elastică, cu aspect de croset în semi T

**11** Caria de biberon:
- A afectează grupul frontal inferior
- B nu influențează calitatea vieții copilului
- C afectează inițial caninii
- D se localizează în general pe suprafețele dentare considerate cu risc scăzut la carie
- E exclude localizarea proximală

**12** În timpul formării dintelui, procesul fiziologic de creștere care nu se suprapune peste alte procese de creștere este:
- A inițierea
- B proliferarea
- C histodiferențierea
- D morfodiferențierea
- E apoziția

**13** Dezavantajul tehnicii DEAN de modificare a extracției alveoloplastice intraseptale constă în:
- A reducerea adâncimii fundului de sac vestibular
- B resorbția accentuată a crestei edentate postextracțional
- C favorizarea apariției exostozelor pe creasta edentată
- D favorizarea apariției unei creste edentate ascuțite
- E favorizarea apariției crestei balante

**14** Morfopatologic, în cazul necrozei pulpare se constată:
- A creșterea valorii succinildehidrogenazei
- B creșterea vâscozității mucopolizaharidelor
- C semne de hiperfuncție odontoblastică
- D reacție eozinofilă
- E marginație leucocitară intensă

**15** Primul molar temporar inferior prezintă ca și caracteristică principală:

A o proeminență cervicală foarte dezvoltată în jumătatea mezială a feței vestibulare
B suprafața distală mult mai lată decât cea mezială
C suprafața ocluzală mult mai îngustă în sens mezio-distal
D două rădăcini turtite în sens vestibulo-oral, egale ca dimensiune
E suprafața de contact cu molarul secund temporar se află la distanță de creasta marginală

**16** În pulpita cronică închisă hiperplazică:

A Țesutul conjunctiv prezintă o tendință de atrofiere
B proliferează odontoblaștii din focarul hiperplazic
C pulpa suferă metaplazie granulomatoasă
D odontoblaștii capătă funcții demineralizante și se transformă în pulpoclaști
E zona pulpară aflată în afara procesului inflamator păstrează un aspect normal

**17** Din mugurii nazali interni se formează:

A partea internă a orbitei
B părțile laterale ale nasului
C buza superioară
D osul incisiv
E părțile laterale ale buzei superioare

**18** Interpoziția heterotropă cu succiune intensă determină:

A ocluzie inversă uni sau bilateral
B scăderea pronunțată a presiunii intraorale
C creșterea tonusului buzei inferioare
D deformarea unghiei degetului interpus, care este rugoasă
E reducerea contracției mușchiului labial inferior și mușchiului moțului bărbiei

**19** În protezarea mobilizabilă scheletată, funcția de retenție a croșetelor din sistemul Ney:

A poate fi realizată pe praguri situate supracingular pe dinții frontali naturali
B este funcția ce asigură stabilitatea protezei în sens lateral
C poate fi realizată prin gheruțe incizale
D este asigurată, în general, de toate porțiunile rigide ale unui croșet
E este funcția ce tinde să se opună forțelor verticale de desprindere

**20** Despre forma dinților temporari se poate afirma:

A coroanele frontalilor prezintă câte o creastă cervicală numai pe fața vestibulară
B coroanele molarilor prezintă câte o creastă cervicală numai pe fața vestibulară
C rădăcinile molarilor se desprind dintr-un trunchi radicular comun
D coarnele pulpare sunt mai scurte și mai late decât ar sugera forma cuspizilor
E coarnele disto-vestibulare ale molarilor sunt situate mai aproape de suprafață



# Restul de 180 de întrebări, cu grila oficială și explicații, gratuit pe potide10.ro

Le rezolvi online și vezi pe loc răspunsul corect și de ce.

**potide10.ro/rezidentiat/subiecte-dentara-2020/**

Scanează cu telefonul