

Rezidențiat · 20 noiembrie 2022

Subiecte rezidențiat 2022 medicină dentară: primele 20 de întrebări

Primele 20 de întrebări din caietul de concurs, din pozele candidaților.

Toate cele 200 de întrebări, cu grila oficială și explicații, gratuit

potide10.ro/rezidentiat/subiecte-dentara-2022/

COMPLEMENT SIMPLU: 1-50 · COMPLEMENT MULTIPLU: 51-200

1. Sindromul Romberg poate cauza:
   - A ectopie dentară
   - B incluzie dentară
   - C diastemă
   - D reincluzie
   - E anodonția de premolar 2

2. Investigarea paraclinică a compartimentului muscular la pacienții cu edentații parțiale întinse se poate realiza prin:
   - A cineradiografia
   - B examen gnatofonic
   - C analiza T-Scan
   - D tonometrie
   - E înregistrarea diagramei Posselt

3. Dehiscența plăgii postextracționale:
   - A este favorizată de folosirea unor lambouri repoziționate și suturate fără a avea un suport osos subiacent
   - B este favorizată de folosirea lambourilor „plic”
   - C este favorizată de folosirea lambourilor „in L”
   - D este favorizată de folosirea unor ace rotunde pe secțiune inserate perpendicular pe mucoasă
   - E poate fi evitată prin sutura în tensiune a lamboului

4. Menționați care dintre erorile produse în timpul preparațiilor pentru protezele dentare fixe este considerată critică:
   - A conicitatea mai mare de 30 de grade
   - B nerespectarea morfologiei ocluzale
   - C atingerea involuntară a dinților vecini
   - D spațiul functional (ocluzal) insuficient
   - E nefinisarea pragului cervical

5. Printre avantajele lamboului semilunar folosit pentru rezecția apicală enumerăm:
   - A accesul larg, optim, atunci când apexul sau leziunea periapicală sunt dificil de localizat
   - B evită crearea unui acces suplimentar în cazul evaluării eronate a dimensiunii leziunii periapicale
   - C lamboul este ușor de repoziționat astfel încât se evită formarea unor pliuri de mucoasă la un pol al plăgii
   - D inserțiile musculare și ale frenurilor nu reprezintă obstacole anatomice care să implice modificarea traseului inciziei
   - E nu se intervine asupra marginii gingivale libere

6. Conectorul principal metalic sub formă de plăcuță:
   - A poate fi aplicat doar la maxilar
   - B lățimea este de maxim 7 mm și grosimea cuprinsă între 0,8-0,9 mm
   - C poate fi aplicat doar la mandibula
   - D cu cât este mai îngust cu atât poate fi mai redusă grosimea lui
   - E lățimea este mai mare de 10 mm și grosimea este cuprinsă între 0,3-0,5 mm

7. Muschiul responsabil de menținerea poziției de postură a mandibulei este, în principal:
   - A pterigoidianul medial
   - B milohioidianul
   - C geniohioidianul
   - D stilohioidianul
   - E pterigoidianul lateral

8 Protezele fixe unidentare extracoronare cu agregare intraradiculară înglobează suplimentar:
- A trepte paracingulare
- B șanțuri axiale
- C puturi parapulpare
- D pivoturi radiculare
- E casete laterale sau cepuri ocluzale

9 Între semnele faciale care se evidențiază la pacientul cu edentație parțială întinsă se remarcă:
- A marginea bazilară apare retrasă
- B șanțurile periorale reduse
- C invaginarea buzelor
- D unghiul goniac își păstrează angulația de 110-120 de grade
- E valoarea indicelui facial mai mare de 84 mm

10 Printre metodele clinice directe de detecție a leziunilor dentare carioase se numără:
- A semnul firului de mătase
- B transiluminarea
- C spectroscopia laser
- D markerii coloranți
- E fluorescența QLF

11 Coafajul indirect la dinții temporari aflați în stadiul 1 și 2 se indică în următoarea situație:
- A carie profundă acută cu simptomatologie limitată
- B pulpită cronică
- C pulpită seroasă totală
- D hipersensibilitate dentară
- E agenezia dintelui succesional

12 Indicați principalul tip de celule din epiteliul gingival:
- A celule Langerhans
- B celule Merkel
- C melanocite
- D celule mezenchimale nediferențiate
- E keratinocite

13 În stadiul II al osteonecrozei maxilare post-medicamentoase, clinic, apar:
- A mobilitate dentară fără etiologie ocluzală/parodontală
- B formare de sechestre osoase
- C comunicare oro-antrală/oro-nazală
- D fractură de mandibulă în „os patologic”
- E fistule mucozale cu punct de plecare osos sau/si tegumentar, fără etiologie dento-parodontală

14 Osteomielita supurată acută:
- A are debut insidios
- B tegumentele supraiacente au aspect normal
- C starea generală a pacientului este bună
- D pacientul este afebril
- E determină anestezie labio-mentonieră în cazul localizării mandibulare

15 Primerul din cadrul sistemului adeziv de generația a IV-a:

A conține monomer hidrofob hema
B are rol fundamental asupra smaltului
C la nivelul dentinei transformă un tesut hidrofob într- unul hidrofil
D poate conține camforchinonă cu rol de solvent
E dacă smaltul este uscat, prezența sa nu influențează legarea adezivului de zonele gravate

16 Procentul de fibroblaste din ligamentul parodontal este de:

A 3%
B 10%
C 35%
D 65%
E 80%

17 Cementul radicular:

A are duritate mai mare decât dentina
B este mai radioopac decât dentina
C cel primar este celular
D are permeabilitate inferioară celorlalte țesuturi dure dentare
E poate fi fibrilar sau afibrilar

18 Erupția dinților permanenți respectă următoarea regulă:

A la fete primul care erupe în general este incisivul central inferior
B etapa secundară a erupției dinților permanenți presupune perioada erupției caninilor, premolarilor și molarilor secunzi
C prima mezializare a mandibulei alterează poziția de erupție a incisivilor inferiori
D cronologia erupției dinților permanenți este influențată într-o mai mare măsură de factorii de mediu
E segmentul cel mai perturbat ca ordine și cronologie este al molarului de minte

19 Semnul patognomonic al incluziei incisivilor centrali superiori, ce are drept cauză obstacolul reprezentat de dinți supranumerari, este:

A rotația incisivilor laterali superiori permanenți
B rotația intraosoasă a incisivilor centrali superiori
C rizaliza incisivilor laterali superiori permanenți
D persistența predecesorilor temporari cu mobilitate redusă sau fără mobilitate
E distoînclinarea incisivilor laterali superiori permanenți

20 Punga lui Fisch în cazul edentației subtotale:

A este dominată de inserția mușchiului orbicular al buzelor
B se examinează cu gura larg deschisă
C permite îngroșarea marginilor protezei pentru îmbunătățirea sprijinului
D este greu de examinat datorită bogăției țesutului submucos
E se examinează cu gura întredeschisă



Restul de 180 de întrebări, cu grila oficială și explicații, gratuit pe potide10.ro

Le rezolvi online și vezi pe loc răspunsul corect și de ce.

potide10.ro/rezidentiat/subiecte-dentara-2022/

Scanează cu telefonul