

Rezidențiat · 19 noiembrie 2023

Subiecte rezidențiat 2023 medicină dentară: primele 20 de întrebări

Primele 20 de întrebări din caietul de concurs, din pozele candidaților.

Toate cele 200 de întrebări, cu grila oficială și explicații, gratuit

potide10.ro/rezidentiat/subiecte-dentara-2023/

COMPLEMENT SIMPLU: 1-50 · COMPLEMENT MULTIPLU: 51-200

1. Diagnosticul diferențial al keratochistului odontogen primordial multilocular se face cu:
   - A Cavitatea osoasă idiopatică
   - B Fibromul ameloblastic
   - C Tumora odontogenă adenomatoidă
   - D Malformațiile arterio-venoase osoase centrale
   - E Chistul odontogen adenomatoid

2. Chiuretele Langer și Mini-Langer:
   - A Sunt un set de patru chiurete
   - B Combină designul chiuretelor Gracey standard 1-2, 7-8 și 15-16
   - C Combină designul chiuretelor Gracey Mini Five cu cel al Gracey "curvettes"
   - D Pot fi adaptate atât pe suprafețele meziale cât și pe cele distale, fără a schimba instrumentul
   - E Au gâtul mai rigid decât al chiuretelor rigide Gracey

3. Proteze fixe unidentare nerecomandate ca elemente de agregare ale puntilor dentare sunt:
   - A Coroanele total metalice
   - B Coroanele metalo-ceramice
   - C Coroanele parțiale
   - D Inlay-urile ocluzale
   - E Coroanele metalo-polimerice

4. Mantaua dentinară sau dentina periferică:
   - A Este un strat hipermineralizat;
   - B Are un aspect festonat, cu concavități orientate spre camera pulpară
   - C Nu prezintă canalicule dentinare și prelungiri Tomes
   - D Traiectul canaliculelor dentinare nu este rectiliniu ci curb
   - E Se prezintă ca o bandă îngustă eozinofilă

5. După Slavicek, mușchii sistemului cranio-mandibular în relație directă cu funcția articulației temporo-mandibulare sunt:
   - A Porțiunea profundă a maseterului
   - B Porțiunea superficială a maseterului
   - C Fasciculul inferior al mușchiului pterigoidian lateral
   - D Fasciculul mijlociu al mușchiului temporal
   - E Fasciculul posterior al mușchiului temporal

6. Rolul morfogenetic al musculaturii oro-faciale a fost confirmat prin înregistrări electromiografice cu electrozi implantati:
   - A Unilateral în mușchii temporali
   - B Bilateral în mușchii maseteri
   - C Unilateral în mușchii milohioidieni
   - D Bilateral în mușchii buccinatori
   - E Bilateral în mușchii pterigoidieni laterali

7 Conceptul de "long centric" se caracterizeaza prin:
- A Alunecare transversală a mandibulei din poziția de relație centrică în cea de intercuspidare maximă
- B Alunecarea mandibulei din poziția de relație centrică în cea de intercuspidare maximă pe o suprafață de 2-2,25 mm
- C Poate fi însoțită de posibilitatea unei ușoare deplasări sagitale a cuspidului de ghidaj în foseta antagonistă
- D Poate fi însoțită de posibilitatea unei ușoare deplasări laterale a cuspidului de ghidaj în foseta antagonistă
- E Libertatea de deplasare a cuspidului de sprijin "in centric" a fost descrisa sub denumirea de "triunghi de toleranță ocluzala*

8 In schema ocluzala "freedom in centric":
- A Intercuspidarea maximă coincide cu relația centrică
- B Deglutiția are loc în relație centrică
- C Raportul ocluzal este de tip cuspid-creastă marginală
- D Mișcarea de propulsie este asigurată de ghidajul canin
- E În mișcarea de lateralitate mandibula este condusă de partea lucrătoare prin ghidaj canin

9 Forma clinică "in bisac" este descrisă la:
- A Granulomul piogen
- B Chistul branhial
- C Ranula
- D Papilomul
- E Granulomul periferic cu celule gigante

10 Gingia marginală:
- A Este porțiunea cea mai apicală a gingiei
- B Este separată de gingia fixă prin șanțul gingiei libere, vizibil în aproximativ 50% din cazuri
- C Reprezintă peretele intern al sulcusului gingival
- D Aderă cu baza ei la papila interdentară
- E Aderă de cement prin țesutul conjunctiv supraepitelial

11 În cadrul testării sensibilității pulpare, testele electrice pot da răspuns fals pozitiv:
- A Apex imatur
- B Dinte cu calcificări la nivelul canalelor radiculare
- C Dintele nu este corect izolat și complet uscat
- D Premedicația pacientului cu cantități mari de narcotice
- E Consum de alcool

12 La articulatoarele semiadaptabile, unghiul Balkwill reprezintă:
- A Unghiul dintre planul bipupilar și linia care unește condilii;
- B Unghiul dintre planul de ocluzie și linia care unește condilii;
- C Unghiul dintre planul Frankfurt și linia care unește condilii;
- D Unghiul dintre planul Camper și linia care unește condilii;
- E Unghiul dintre planul bazal mandibular și linia care unește condilii;

13 În analiza cinematicii mandibulare în plan orizontal:
- A Pe partea nelucrătoare, condilul orbitant efectuează o mișcare de rotație și translație înainte, în jos și lateral
- B Pe partea nelucrătoare, condilul pivotant efectuează o mișcare de rotație și translație înainte, în jos și medial
- C Traiectoria de deplasare a condilului orbitant în planul sagital descrie unghiul Bennett în mișcarea de propulsie
- D Deplasarea laterală a condilului pivotant în cursul mișcării de lateralitate a mandibulei reprezintă mișcarea Bennett
- E Traiectoria de deplasare a condilului pivotant cu planul sagital descrie unghiul Bennett în mișcarea de lateralitate

14 În etapa de formare a smaltului, fluorul, borul, molibdenul, prezente în alimentație, pot determina unele modificări în morfologia dinților:
- A Rotunjirea vârfurilor cuspizilor
- B Creșterea profunzimii fosetelor și șanțurilor ocluzale
- C Creșterea dimensiunii coroanei dentare
- D Scăderea cristalinității smaltului
- E Cristale de hidroxiapatită mai mici si mai solubile

15 Evoluția leziunii carioase în cement este rapidă datorită:
- A Gradului mare de mineralizare a cementului
- B Prezenței stratului granular Tomes foarte mineralizat
- C Prezenței ligamentelor alveolo-dentare orientate aproape în unghi drept pe suprafața radiculară
- D Durității mai mari a cementului în comparație cu dentina
- E Permeabilității inferioare a cementului în comparație cu celelalte țesuturi dure dentare

16 Instrumentele sonice și ultrasonice sunt contraindicate (Darby și Walsh):
- A La pacienți cu dificultăți de înghițire (disfagie)
- B În prezența dentinei expuse (hipersensibilitate)
- C În intervenții chirurgicale
- D În reducerea obturațiilor debordante de amalgam
- E La copii, pe dinți temporari

17 Aspectele radiotransparenței în caria simplă dentară, la nivelul fetelor vestibulare sau orale sunt:
- A Evidente încă din faza incipientă
- B Rotunde pentru leziunile carioase mari
- C Ovalare pentru leziunile carioase mici
- D Semilunare pentru leziunile carioase mari
- E De forma unui triunghi cu contururi bine exprimate și baza spre joncțiunea smalt-dentină

18 În cadrul distrucției parodontale induse de citokine, factorul de necroză tumorală alfa (TNF-alfa) are următoarele efecte:
- A Scade activitatea neutrofilelor
- B Crește expresia moleculelor de adeziune ICAM la nivelul celulelor epiteliale
- C Stimulează sinteza metaloproteinazelor
- D Inhibă apoptoza fibroblastelor
- E Inhibă osteoclastele

19 Printre elementele specifice de diagnostic în parodontita apicală acută la dinții permanenți imaturi în stadiul exteriorizat (abces) menționăm:

A Dureri lancinante
B Dureri provocate
C Cameră pulpară deschisă
D Teste de vitalitate pozitive
E Percuție în ax ușor pozitivă

20 Sindromul de hipomineralizare molar-incisiv (MIH):

A Se însoțește de sensibilitate la stimuli calzi
B În faze avansate, leziunile au aspect alb-cretos și suprafață netedă
C Zonele afectate nu sunt bine delimitate de cele sănătoase
D Se însoțește de sensibilitate la stimuli reci
E Zonele poroase nu sunt predispuse la carii



Restul de 180 de întrebări, cu grila oficială și explicații, gratuit pe potide10.ro

Le rezolvi online și vezi pe loc răspunsul corect și de ce.

potide10.ro/rezidentiat/subiecte-dentara-2023/

Scanează cu telefonul