

Rezidențiat · 17 noiembrie 2024

Subiecte rezidențiat 2024 medicină dentară: primele 20 de întrebări

Primele 20 de întrebări din caietul de concurs, din pozele candidaților.

Toate cele 200 de întrebări, cu grila oficială și explicații, gratuit

potide10.ro/rezidentiat/subiecte-dentara-2024/

COMPLEMENT SIMPLU: 1-50 · COMPLEMENT MULTIPLU: 51-200

1. Un pacient se prezintă în cabinetul stomatologic pentru o reconstituire coronară la un dinte pluriradicular, asimptomatic. La examenul obiectiv se constată o cavitate carioasă pe fundul careia dentina este ușor colorată, iar testul de vitalitate este pozitiv la intensități foarte mari ale excitantului. Diagnosticul este:
   - A Pulpită cronică deschisă ulceroasă
   - B Pulpită cronică închisă propriu-zisă
   - C Pulpită cronică închisă hiperplaziată
   - D Necroză pulpară
   - E Carie recidivantă cu pierderea vechii obturații

2. Simptomatologia subiectivă a pulpitei cronice cu camera pulpară deschisă (polipoasă) la dinții permanenți cuprinde:
   - A Disconfort constant
   - B Criză dureroasă de intensitate variabilă
   - C Sângerare localizată
   - D Durere difuză de lungă durată
   - E Durere cu caracter nocturn

3. Sindromul Romberg se referă la:
   - A Disostoză cleidocraniană
   - B Avitaminoză D
   - C Nanism hipofizar
   - D Displazie ectodermală
   - E Hemiatrofie facială

4. Tartrul dentar este un complex organo-mineral și:
   - A Este situat sub marginea gingivală, vizibil în cavitatea orală
   - B Este de culoare alb-gri
   - C Menține placa în contact strâns cu țesutul gingival
   - D Se depune mai ușor pe fețele vestibulare ale molarilor inferiori
   - E Inițial acționează asupra parodontiului prin iritație mecanică a papilei interdentare

5. În cadrul cimentării adezive:
   - A Sărurile ceramice se curăță cu acid fosforic 35% pentru 30 s
   - B Gelul vâscos cu 6% HF se utilizează intraoral
   - C Toate tipurile de ceramici necesită gravaj acid
   - D Ceramica pe bază de feldspat se gravează acid timp de 60 s
   - E Tratamentul tribochimic cu silice se utilizează la nivelul ceramicilor ce se gravează acid

6. Fibrele conjunctive gingivale, în funcție de direcția și inserția lor, pot fi:
   - A Alveolo-gingivale care trec peste vârful crestei alveolare și se inserează în periostul corticalei externe
   - B Dento-periostale care se proiectează în lamina propria a gingiei adiacente
   - C Transeptale care se inserează în periostul corticalei externe
   - D Circulare, localizate sub epiteliul joncțional și înconjoară dintele ca un inel
   - E Dento-gingivale, inserate în cement și direcție apicală

7. Referitor la realizarea formei de rezistență pentru cavitățile convenționale de clasa a III-a:
   - A Se îndepărtează smaltul demineralizat de la marginile cavității
   - B Se pot face concesii, din motive fizionomice
   - C Se accentuează unghiurile de întâlnire dintre pereții laterali
   - D Se conservă o porțiune cât mai mare din peretele prin care s-a realizat accesul
   - E Întâlnirea pereților laterali cu peretele parapulpar se face în unghiuri ascuțite

8 Un pacient prezintă următoarea simptomatologie la nivelul unui dinte monoradicular: sensibilitatea la percuția în ax, congestia mucoasei în dreptul apexului, simptomatologie de pulpită totală. Diagnosticul este:

A Parodontită apicală
B Pulpită acută seroasă totală
C Pulpită acută purulentă
D Abces acut periapical
E Abces acut apical

9 Printre metodele clinice indirecte de detecție a leziunilor dentare, regăsim:

A Tehnici ultrasonice
B Metoda vizual-tactilă
C Metoda vizuală cu cameră intraorală
D Aer abraziunea
E Starea gingiei

10 Bacteriile parodonto-patogene evită sistemul imun al organismului folosindu-se de:

A Invazia tisulară
B Capsula intracelulară
C Fimbriile bacteriene
D Distrucția tisulară
E Proteazele bacteriene

11 În cazul parodontitei apicale cronice difuze a dinților temporari:

A Apare sensibilitate la masticație
B Se face diagnostic diferențial cu abcesul parodontic
C Evoluția este simptomatică
D Apare durere spontană de intensitate mare
E Poate apare subminarea peretelui osos vestibular în totalitate

12 Printre indicațiile de extracție a dinților permanenți, în cadrul tratamentului preprotetic, regăsim:

A Edentația subtotală maxilară, atunci când împiedică adaptarea marginală corectă a unei proteze
B Dinți în poziții imposibil de redresat ortodontic
C Dinți stâlpi de punte cu mobilitate de gradul III în bloc cu lucrarea protetică fixă, care produc leziuni traumatice ale părților moi
D Echilibrarea ocluzală sau simetria arcadei în anumite situații clinice
E Imposibilitatea practică de a realiza un tratament conservator pentru leziuni dento-parodontale la pacienții vârstnici (peste 65 de ani)

13 Alveolotomia cu rezeție marginală limitată a tablei osoase vestibulare este indicată în cazul în care rădăcinile sunt situate:

A Sub lucrări protetice conjuncte
B Profund intraalveolar
C În focarul de fractură
D În imediata apropiere a marginii alveolare
E În configurații morfologice anormale ce nu pot fi corectate ortodontic

14 Conform clasificării lui Frankl privind evaluarea comportamentului pacientului pedodontic:

A Comportamental sfidător se încadrează în Tip I
B Copilul supraprotejat, care colaborează greu se încadrează în Tip II
C Nu se pot urmări progresele obținute
D Comportamentul irascibil este întotdeauna negativ
E Comportamentul influențabil este un comportament negativ

15 Unghiul dintre incisivii centrali inferiori și planul bazal mandibular prezintă o valoare normală de:
A +2-4°
B Sub 70°
C 140-145°
D 90°±5°
E 190°±5°

16 Simptomatologia hiperplaziei gingivale hidantoinice include:
A Dispariția spontană a hiperplaziei hidantoinice la câteva zile de la întreruperea administrării medicamentului
B O hiperplazie cu aspect lobulat, de culoare roz-deschis, fără inflamație supraadăugată
C Un caracter extensiv, până la generalizarea hiperplaziei
D O hiperplazie de mici dimensiuni, de forma unor mărgele, la început în zona marginii gingivale
E O hiperplazie accentuată a zonei de gingii fixată

17 Keratochistul reprezintă:
A 20% din chisturile odontogene
B Al doilea cel mai frecvent chist al maxilarelor
C 5-10% din totalul chisturilor odontogene
D Cea mai frecventă tumoră odontogenă
E 20% din chisturile de dezvoltare

18 Dintele cel mai interesat de transpoziție este:
A Incisivul central superior
B Incisivul lateral superior
C Caninul permanent superior
D Caninul temporar superior
E Premolarul superior

19 Macroscopic, lățimea medie a spațiului ligamentului parodontal este:
A Diminuată la nivelul dinților care au fost supuși hiperfuncției
B De aproximativ 2 mm
C Mai îngustă în regiunile apicale și gingivale
D Diminuată în jurul dinților care nu au erupt
E Mai largă în regiunea mijlocie a rădăcinii

20 Referitor la sistemele ceramice:
A Vitroceramicile sunt gravabile cu acid ortofosforic
B Ceramicile pe bază de disilicat de litiu se utilizează exclusiv pentru structuri
C Din ceramicile leucitice se realizează bonturi implantare
D Ceramicile aluminoase infiltrate se utilizează prin tehnologia slip casting
E Alumina armată cu zirconia se utilizează doar monolitic în zona laterală



Restul de 180 de întrebări, cu grila oficială și explicații, gratuit pe potide10.ro

Le rezolvi online și vezi pe loc răspunsul corect și de ce.

potide10.ro/rezidentiat/subiecte-dentara-2024/

Scanează cu telefonul