

Rezidențiat · 15 noiembrie 2026

Subiecte rezidențiat 2026 medicină dentară: primele 20 de întrebări

Primele 20 de întrebări din caietul de concurs, din pozele candidaților.

Toate cele 200 de întrebări, cu grila oficială, gratuit

potide10.ro/rezidentiat/subiecte-dentara-2026/

COMPLEMENT SIMPLU: 1-50 · COMPLEMENT MULTIPLU: 51-200

1. Saliva are o serie de proprietăți antimicrobiene capabile să modeleze colonizarea cavității orale cu microorganisme. Ea acționează prin mai multe mecanisme printre care se găsește:
   A scurtarea timpului de clearance al alimentelor fermentabile
   B capacitatea de diluare
   C efectul de spălare prin prezența apei
   D inhibarea aderenței microorganismelor
   E formarea bolului alimentar

2. Referitor la substanțele folosite pentru evicțiunea gingivală:
   A oximetazolina este substanță astringentă
   B sulfatul de fier produce distrucții tisulare severe
   C Magic Foamcord este pe bază de clorură de aluminiu
   D sulfatul de fier poate interfera cu priza unor materiale de amprentă
   E Retraction Paste este pe bază de clorură de aluminiu

3. Chiuretele Gracey 5 - 6 se folosesc pentru dinții:
   A anteriori și premolari
   B molari
   C posteriori, vestibular și oral
   D posteriori, mezial
   E posteriori, distal

4. Tratamentul diastemei vera vizează:
   A ca debutul acestuia să fie după formarea completă a rădăcinilor incisivilor centrali superiori
   B aplicarea inelelor de cauciuc direct pe incisivii centrali inferiori
   C extracția molarilor de minte inferiori
   D folosirea reciprocității forțelor
   E ca debutul tratamentului să fie când rădăcinile incisivilor centrali superiori sunt formate pe jumătate

5. Lamboul intrasulcular triunghiular este format dintr-o incizie:
   A orizontală, în șanțul gingival, completată la cele două extremități cu două incizii verticale de descărcare
   B verticală, ce se practică la distanță de marginea gingivală liberă
   C orizontală, practicată în șanțul gingival (care interesează și papilele interdentare) continuată cu o incizie verticală de descărcare
   D curbă, convexă spre marginea gingivală liberă
   E orizontală, de-a lungul marginii gingivale libere

6. În cazul avulsiei dentare:
   A dintele avulsionat se manevrează de rădăcină
   B dacă e posibil, dintele se va reimplanta imediat
   C prognosticul este cel mai bun dacă reimplantarea are loc în primele 3 ore de la traumatism
   D porțiunile necrozate de ligament se îndepărtează cu instrumente mecanice
   E imobilizarea se realizează timp de 4 săptămâni

7. După Sawhney tipul II de anchiloză temporomandibulară presupune:
   A fuziune osoasă extinsă, fără limite de demarcație lateral sau medial
   B anchiloză non-osoasă, cu limite de demarcație radiotransparente
   C fuziune osoasă completă a suprafețelor articulare, dar cu zone radiotransparente
   D anchiloză osoasă laterală articulară, dar cu spațiu liber medial
   E anchiloză osoasă medială articulară, dar cu spațiu liber lateral

8 După Moyer, ocluzia deschisă complexă:
- A este numită și ocluzie deschisă totală
- B este consecința unor afecțiuni reumatice ale articulației temporomandibulare
- C se corelează cu cicatrici cheloide postextracționale
- D este consecința unei displazii verticale primare
- E prezintă o creștere excesivă verticală a complexului dentoalveolar în zona molară

9 Placa palatinală de protecție în cazul deschiderilor postextracționale bucosinuzale medii, se menține:
- A 5 - 7 zile
- B 14 - 20 zile
- C o lună
- D 2 - 3 luni
- E 4 - 6 luni

10 Meziodensul:
- A apare frecvent simetric, paramedian maxilar
- B erupe mereu înaintea incisivilor centrali superiori, care pot rămâne incluși
- C când este unic, apare pe linia mediană
- D se comportă ca un element străin față de dinții normali
- E de obicei este pluricuspidat, cu aspect de molar

11 Referitor la condiționarea suprafețelor în vederea cimentării adezive:
- A gelul vâscos de 10% acid sulfuric se utilizează la reparația intraorală a ceramicii fracturate
- B îndepărtarea sărurilor ceramice formate prin gravare se realizează cu o soluție de Na2CO3-Ca2CO3
- C ceramica pe bază de disilicat de litiu se gravează cu gel HF de 4 - 5% aplicat 20s
- D ceramica policristalină pe bază de alumina se gravează cu gel HF de 9% aplicat 120s
- E ceramica policristalină pe bază de alumina se gravează cu 10% acid sulfuric sub formă de gel aplicat 120s

12 Printre caracteristicile cavității de acces pentru premolarii mandibulari, se regăsește:
- A este plasată la mijlocul feței ocluzale ușor lingualizată
- B la premolarul doi, camera pulpară este localizată în întregime sub cuspidul vestibular
- C la premolarul doi, camera pulpară este localizată în întregime sub cuspidul lingual
- D are formă triunghiulară
- E are axul lung vestibulo-lingual

13 Cantitatea de anestezic folosită în mod frecvent pentru anestezia plexală este de:
- A 1,5 - 1,7 ml
- B 0,15 - 0,20 ml
- C 0,4 ml
- D 1,7 - 2 ml
- E 0,2 - 0,3 ml

14 Faza de tratament restaurator al cariei simple se caracterizează prin:
- A realizarea protecției dentino-pulpare
- B refacerea morfofuncțională a dintelui afectat de leziunea carioasă
- C îndepărtarea țesuturilor dure dentare alterate ireversibil de procesul carios
- D reprezintă prima etapă în tratamentul leziunilor carioase simple
- E crearea unei preparații care să permită inserarea și menținerea restaurării în interiorul său

15 Pulpectomia vitală a dinților temporari se indică:
- A în resorbții radiculare patologice
- B la copii cu patologie generală asociată
- C în evoluție nefavorabilă a pulpotomiei
- D în pulpitele totale ale dinților temporari aflați în stadiul 3 evolutiv
- E în pulpită acută seroasă parțială

16 Referitor la tratamentul cariei simple a dinților permanenți imaturi:
- A coafajul natural se menține minim 2 - 4 săptămâni pentru producerea neodentinogenezei
- B tehnica excavațiilor succesive presupune repetarea de mai multe ori a coafajului direct
- C coafajul natural este o metodă de tratament a plăgii dentinare care derivă din coafajul direct
- D coafajul natural este o metodă de protecție pulpară
- E coafajul natural se indică în cariile medii

17 Sigilanții bazați pe materiale bioceramice:
- A sunt hidrofobi
- B au efect antimicrobian pe E. Faecalis
- C sunt ușor de îndepărtat în totalitate din canalul radicular
- D prezintă contracție de priză
- E au solubilitate mare

18 Transpoziția dentară:
- A se referă la inversarea poziției incisivului central superior cu incisivul lateral superior
- B se referă la apariția la distanță a unui dinte față de locul normal de erupție
- C completă, interesează molarii I și II permanenți
- D completă canin / incisiv lateral coronoradicular nu are indicație specifică de tratament
- E interesează la arcada inferioară canin / premolar I

19 Predentina:
- A este depusă de odontoblaștii nepolarizați, de aceea nu prezintă canalicule dentinare
- B este caracterizată prin prezența, pe o secțiune transversală și longitudinală, de numeroși tubuli dentinari
- C este puternic mineralizată
- D are o grosime care crește spre joncțiunea amelo-dentinară
- E se prezintă ca o bandă îngustă eozinofilă și conține 97% colagen de tip V

20 La pacienții adulți, normoponderali, fără afecțiuni generale asociate, doza terapeutică maximă recomandată pentru mepivacaină 3% este de:
- A 7 mg / kg corp, fără a depăși 500 mg
- B 6 mg / kg corp, maxim 400 mg
- C 9 - 18 mg
- D 4 mg / kg corp, fără a depăși 300 mg
- E 3,2 mg / kg corp, dar nu mai mult de 400 mg



Restul de 180 de întrebări, cu grila oficială, gratuit pe potide10.ro

Le rezolvi online și vezi pe loc răspunsul corect.

potide10.ro/rezidentiat/subiecte-dentara-2026/

Scanează cu telefonul