

Rezidențiat · 20 noiembrie 2022

Subiecte rezidențiat 2022 farmacie, caietul A: primele 20 de întrebări

Primele 20 de întrebări din caietul de concurs, din pozele candidaților.

Toate cele 200 de întrebări, cu grila oficială și explicații, gratuit

potide10.ro/rezidentiat/subiecte-farmacie-2022/

COMPLEMENT SIMPLU: 1-50 · COMPLEMENT MULTIPLU: 51-200

1. Eradicarea infecției cu streptococ beta-hemolitic de grup A (SBGHA) la purtătorii cronici se poate face asociind rifampicina cu:
   - A Clindamicina
   - B Benzatinpenicilina G
   - C Levofloxacina
   - D Doxiciclina
   - E Cefixima

2. În cazul sistemului terapeutic transdermic cu clonidină CATAPRESS TTS, membrana de film continuu care se poate sigila la cald este fabricată din:
   - A Polietilenă, clorură de polivinil sau nylon
   - B Copolimeri de etilen/vinil acetat
   - C Polipropilenă
   - D Elastomeri tip silicon
   - E Uretani

3. Terapia inițială de elecție la pacienții cu meningită criptococică acută și SIDA include:
   - A Amfotericină B + flucitozină
   - B Fluconazol
   - C Ketoconazol
   - D Micafungină
   - E Anidulafungină

4. Monitorizarea terapiei anticoagulante prin determinarea timpului de tromboplastină parțial activată se face pentru:
   - A Warfarină
   - B Heparină nefracționată
   - C Fondaparinux
   - D Enoxaparină
   - E Dalteparină

5. Teriparatidul este contraindicat pacienților cu risc crescut de:
   - A Insuficiență cardiacă
   - B Osteosarcom
   - C Osteoporoză idiopatică sau hipogonadală
   - D Hiperpotasemie
   - E Osteonecroză maxilară

6. Alegeți benzodiazepina numită și "drogul violului":
   - A Alprazolam
   - B Diazepam
   - C Flunitrazepam
   - D Lorazepam
   - E Oxazepam

7. Alegeți parametrul acțiunii farmacodinamice care se exprimă prin dozele eficace:
   - A Eficacitatea maximă
   - B Latența
   - C Selectivitatea
   - D Potența
   - E Timpul efectului maxim

8 Sistemul terapeutic OCCUSERT conține substanța medicamentoasă:
A Pilocarpina bază
B Atropina bază
C Fizostigmina
D Idoxuridina
E Acetatul de hidrocortizon

9 Este o contraindicație absolută pentru terapia hormonală de substituție la menopauză cu estrogeni și progestative:
A Hipertrigliceridemia
B Tromboza venoasă profundă activă
C Hipotiroidismul
D Hipocalcemia severă
E Tensiunea arterială crescută

10 Terapia triplă pentru eradicarea infecției cauzate de Helicobacter pylori cuprinde asocierea:
A Inhibitor de pompă de protoni + amoxicilină + subsalicilat de bismut
B Inhibitor de pompă de protoni + claritromicină + amoxicilină
C Inhibitor de pompă de protoni + metronidazol + tetraciclină
D Inhibitor de pompă de protoni + metronidazol + levofloxacină
E Inhibitor de pompă de protoni + subsalicilat de bismut + tetraciclină

11 Conform monografiei Comprimate din FRX, se conservă în recipiente bine închise și în prezența unei substanțe deshidratante comprimatele:
A Neacoperite
B Acoperite enterosolubile
C Efervescente
D Orodispersabile
E Cu eliberare modificată

12 Conform FRX, referitor la unguente, este adevărat enunțul:
A Toate unguentele se prepară cu baze de unguent cu proprietăți emulsive sau peliculogene
B Pastele sunt unguente-emulsii
C Cremele sunt unguente-suspensii
D Pot conține antioxidanți și conservanți antimicrobieni potriviți
E Mărimea particulelor se determină pentru unguente-emulsii

13 În sindromul de abstinență la opioide se instalează sensibilizarea ("up-regulation") receptorilor:
A Colinergici
B Glutamatergici
C Gabaergici
D Adrenergici
E Canabinoidergici

14 Tratamentul alternativ recomandat pentru BPOC stabilă cu puține simptome, puține riscuri este reprezentat de:
A Agoniști beta-2 adrenergici cu durată scurtă de acțiune
B Teofilină
C Agoniști beta-2 adrenergici cu durată lungă de acțiune
D Corticosteroizi inhalatori
E Roflumilast

15 În categoria bazelor de unguent - clasa chimică hidrocarburi regăsim:
A Cetaceu
B Ceară galbenă
C Vaselină albă
D Stearină
E Axungia

16 Indicați substanța medicamentoasă care crește punctul de topire al supozitoarelor:
A Camfor
B Fenol
C Mentol
D Eufilină
E Eucaliptol

17 Indicați enunțul corect referitor la oxidul de etilen folosit ca agent sterilizant:
A Are penetrabilitate mică prin ambalaje
B Este un gaz toxic și exploziv
C Se utilizează pentru sterilizarea materialelor termorezistente
D Este bacteriostatic și fungistatic
E Eficacitatea sa nu depinde de numărul și natura germenilor de distrus

18 La pacienții cu embolie pulmonară masivă, compromiși în mod evident hemodinamic și fără risc de sângerare, ar trebui să se administreze:
A Clopidogrel
B Warfarină
C Apixaban
D Acid acetilsalicilic
E Alteplază

19 Care este tratamentul de elecție al gonoreei la femeile însărcinate care prezintă infecție concomitentă cu Chlamydia trachomatis?
A Doxiciclină
B Benzatinbenzilpenicilină
C Tinidazol
D Tetraciclină
E Azitromicină

20 Alegeți lungimea de undă care aparține domeniului spectral infraroșu IR:
A 256 nanometri
B 354 nanometri
C 540 nanometri
D 0,65 micrometri
E 5 micrometri



Restul de 180 de întrebări, cu grila oficială și explicații, gratuit pe potide10.ro

Le rezolvi online și vezi pe loc răspunsul corect și de ce.

potide10.ro/rezidentiat/subiecte-farmacie-2022/

Scanează cu telefonul