

Rezidențiat · 17 noiembrie 2024

Subiecte rezidențiat 2024 farmacie, caietul A: primele 20 de întrebări

Primele 20 de întrebări din caietul de concurs, din pozele candidaților.

Toate cele 199 de întrebări, cu grila oficială și explicații, gratuit

potide10.ro/rezidentiat/subiecte-farmacie-2024/

COMPLEMENT SIMPLU: 1-50 · COMPLEMENT MULTIPLU: 51-200

1. Sunt baze de unguent hidratate:
   - A Silicongelurile
   - B Polietilenglicolgelurile
   - C Lipogelurile
   - D Bazele emulsionabile
   - E Bazele emulsionate

2. În cazul persoanelor cu piele hipersensibilă se utilizează preparate fotoprotectoare care conțin substanța ecran pentru razele u.v.:
   - A Acid p-aminobenzoic
   - B Acid azelaic
   - C Benzofenonă
   - D Dioxid de titan
   - E Uree

3. Conform FR X - Supliment 2004, nu se adaugă conservanți antimicrobieni în preparatele destinate injectării pe cale:
   - A Intravenoasă
   - B Intramusculară
   - C Subcutanată
   - D Epidurală
   - E Intradermică

4. Este un polizaharid natural folosit ca agent de suspensie:
   - A Amidon pregelatinizat
   - B Amidon glicolat de sodiu
   - C Gelatină
   - D Gumă arabică
   - E Silicagel

5. Efectul hipercromic constă în:
   - A Creșterea intensității benzilor de absorbție
   - B Deplasarea benzilor de absorbție spre lungimi de undă mai mici
   - C Scăderea intensității benzilor de absorbție
   - D Deplasarea benzilor de absorbție spre lungimi de undă mai mari
   - E Micșorarea distanței dintre nivelurile de energie fundamental și excitat

6. Referitor la supozitoare, indicele de hidroxil caracterizează:
   - A Bazele liposolubile
   - B Excipienții hidrosolubili
   - C Excipienții hidrodispersabili
   - D Gelatina
   - E Spanurile

7. Selectați enunțul corect referitor la tratamentul farmacologic în artroza șoldului și a genunchiului:
   - A Paracetamolul este mai eficace decât antiinflamatoarele nesteroidiene
   - B Antiinflamatoarele nesteroidiene topice se asociază obligatoriu cu antiinflamatoare nesteroidiene orale
   - C Corticosteroizii în injecții intra-articulare pot fi administrați concomitent cu analgezice orale
   - D Acidul hialuronic este recomandat, de rutină, la majoritatea pacienților
   - E Opioidele trebuie administrate în doza maximă tolerată

8 Conform FR X, indicatorul biologic pentru sterilizarea prin căldură uscată este reprezentat de sporii de:
A Bacillus stearothermophilus
B Clostridium sporogenes
C Candida albicans
D Bacillus subtilis
E Staphylococcus aureus

9 Agentul de permeabilizare utilizat pentru creșterea penetrației oculare este:
A Clorura de benzalconiu
B Acetatul de fenil mercur
C Boratul de fenil mercur
D Metilceluloza
E Alcoolul polivinilic

10 Conform FR X, componentele masei gelatinoase folosită ca bază de supozitoare sunt:
A Gelatină și apă distilată
B Gelatină, glicerină și apă distilată
C Gelatină, glicerină și soluție conservantă
D Amidon, glicerină și apă distilată
E Glicerină și soluție conservantă

11 Care dintre medicamentele următoare este un agent de primă linie în tulburările de anxietate?
A Duloxetină
B Alprazolam
C Buspironă
D Quetiapină
E Pregabalină

12 Selectați enunțul corect referitor la Sennae folium/Sennae fructus:
A Administrarea se face dimineața
B Pentru aceste produse vegetale dozele sunt identice indiferent de pacient
C Preparatele din frunze de Senna se administrează mamelor care alăptează
D Preparatele din fructe de Senna se folosesc în pediatrie datorită efectului blând
E Extractele din frunze de Senna se utilizează în siguranță pe termen lung

13 Excipientul care se poate utiliza singur ca bază de unguent este:
A Alcoolul cetilic
B Ceara
C Glicerolul
D Uleiul de floarea-soarelui
E Vaselina

14 Naloxona:
A Este un agonist-antagonist opioid
B Produce analgezie moderată
C Se administrează doar în perfuzie intermitentă
D Reduce deprimarea respiratorie produsă de morfină
E Prezintă reacții adverse de tip opioid

15 Pentru determinări analitice cantitative prin gaz cromatografie (GC) se utilizează:
A Aria picului cromatografic
B Timpul de retenție
C Volumul de retenție
D Indicele de separare Kovats
E Indicele de retenție Kovats

16 Care dintre următoarele substanțe medicamentoase prezintă activitate combinată estrogenică, progesteronică și androgenică:
A Ospemifem
B Venlafaxină
C Medroxiprogesteron
D Tibolonă
E Bazedoxifen

17 Care dintre următoarele substanțe medicamentoase este inductor enzimatic?
A Eritromicină
B Furosemid
C Metronidazol
D Griseofulvină
E Izoniazidă

18 Care dintre următoarele medicamente antidepresive are efect inhibitor crescut asupra CYP2D6?
A Bupropiona
B Fluvoxamina
C Fluoxetina
D Mirtazapina
E Citalopramul

19 Este promotor de absorbție pentru calea nazală de tip inhibitor enzimatic:
A Glicolatul de sodiu
B Laurilsulfatul de sodiu
C Boroleucina
D Lizofosfatidilcolina
E Acidul oleic

20 Conform FR X - Supliment 2004, comprimatele gastrorezistente trebuie să se dezagrege:
A În două ore în acid clorhidric 0,1M
B În trei ore în acid clorhidric 0,1M
C Într-o oră în acid clorhidric 0,1M
D În 60 minute în soluție tampon fosfat pH 6,8
E În 180 minute în soluție tampon fosfat pH 6,8



Restul de 179 de întrebări, cu grila oficială și explicații, gratuit pe potide10.ro

Le rezolvi online și vezi pe loc răspunsul corect și de ce.

potide10.ro/rezidentiat/subiecte-farmacie-2024/

Scanează cu telefonul