

Rezidențiat · 21 noiembrie 2021

Subiecte rezidențiat 2021 medicină, caietul B: primele 20 de întrebări

Primele 20 de întrebări din caietul de concurs, din pozele candidaților.

Toate cele 200 de întrebări, cu grila oficială și explicații, gratuit

potide10.ro/rezidentiat/subiecte-medicina-2021/

COMPLEMENT SIMPLU: 1-50 · COMPLEMENT MULTIPLU: 51-200

1. Metoda definitivă de securizare a cailor aeriene, in cazul traumatismelor este:
   - A inserția unui tub toracic pe linia axilară anterioară, în spațiul 4 sau 5 intercostal
   - B imobilizarea coloanei cervicale
   - C plasarea unui angiocateter prin al doilea spațiu intercostal
   - D intubatia orotraheală
   - E tracționarea mandibulei anterior

2. Una dintre afirmatiile legate de drenurile pasive (drenaje Penrose) este adevărată:
   - A mențin o cale pe care fluidele să o urmeze, fără prezența unei aspirații care să le crească fluxul
   - B deși alcatuite din silicon, acestea tind sa fie rigide
   - C de obicei sunt conectate la un burduf pliabil sau la un receptor colector compresibil
   - D sunt de doua tipuri (Jackson-Pratt și Hemovac), montate intraoperator pentru a evacua colectii lichidiene sau potențiale
   - E nu sunt o cale cu dublu-sens pentru bacterii

3. Cel mai frecvent agent incriminat in infectiile severe postsplenectomie este:
   - A Escherichia coli
   - B Neisseria meningitidis
   - C Streptococul beta-hemolitic
   - D Streptococcus pneumoniae
   - E Staphylococcus aureus

4. Care dintre urmatoarele afecțiuni poate genera stridor expirator la adult?
   - A laringomalacie
   - B neoplasm bronșic
   - C epiglotita
   - D angioedem
   - E crup

5. Mutatia genetică cel mai frecvent exprimata și care apare cel mai devreme in tumorile maligne pancreatice are loc la nivelul:
   - A receptorilor HER 2, HER 3 și HER 4
   - B genei supresoare tumorale p53
   - C oncogenelor K-ras
   - D receptorilor EGF
   - E genei supresoare tumorale p 16

6. Care dintre urmatoarele afirmatii privind diagnosticul gonoreei e adevarata? [in afara tematicii]
   - A cultura reprezinta principalul test diagnostic
   - B pentru realizarea screening-ului la femei asimptomatice, se prefera testarea unei probe endocervicale
   - C in cazul probelor faringiene, este indicat examenul microscopic direct
   - D culturile sangvine reprezinta principala metoda de diagnostic in cazul unei posibile infectii diseminate
   - E prima urina de dimineata nu se utilizeaza ca proba de diagnostic la femei

7. Deficitul de antitrombina:
   - A se poate manifesta clinic prin purpura fulminanta neonatala
   - B este identificat prin testare genetica
   - C se poate insoti de o rezistenta relativa la heparina
   - D se insoțește de creșterea timpului de protrombina
   - E scade riscul de tromboze venoase

8 Caracteristicile piciorului in neuropatia diabetică, includ:
- A pierderea parului
- B tegumente reci
- C paloare, decolorare
- D semne de gangrena
- E pierderea arcului plantar și degete deformate în gheară

9 Referitor la cardioversia din fibrilatia atriala este adevarat ca:
- A pacientii necesita anticoagulare timp de 6 saptamani anterior cardioversiei
- B utilizarea DOAC (direct oral anticoagulant) nu este recomandata
- C ecografia transesofagiana este obligatorie inainte de cardioversie în toate cazurile
- D poate fi obtinuta prin administrare de propafenona pe cale orala
- E poate fi obtinuta printr-o combinație digoxin, betablocante

10 O scadere a ratei filtrarii glomerulare (RFG) la valori cuprinse intre 30- 44 ml/min/1,73 mp descrie:
- A boala cronica de rinichi (BCR) stadiul 02 - RFG ușor scazuta cu alte manifestari ale afectarii renale
- B BCR stadiul G3a - RFG moderat scazuta cu sau fara alte manifestari ale afectarii renale
- C BCR stadiul G3b - RFG moderat pana la foarte scazuta
- D BCR stadiul 04 - RFG foarte scazuta cu sau fara alte manifestari ale afectarii renale
- E BCR stadiul 05 - boala renala terminala

11 In hipertensiunea maligna, tinta terapeutica/interval de timp este:
- A reducerea imediata cu 25% a tensiunii arteriale medii (TAM)
- B reducerea imediata a tensiunii arteriale sistolice (TAS) la 100 - 120 mmHg
- C reducere cu 25% a TAM în cateva ore
- D reducerea imediata a TAS < 140 mmHg
- E reducerea imediata a TAS < 160 mmHg

12 Cea mai frecventa forma de prezentare a tumorilor carcinoide ale intestinului subtire este:
- A sangerarea
- B invaginatia
- C scaderea ponderala
- D ocluzia intestinala
- E anorexia

13 In lupusul discoid:
- A pana la 50% dintre pacienti vor avea afectare pulmonara
- B pericardita este frecventa
- C doar tegumentul este afectat
- D afectarea renala apare in 30% din cazuri
- E pot fi intalnite episclerita, conjunctivita, nevrita optica

14 In alunecarea epifizei capului femural (AECF):
- A hipotiroidismul reprezinta un factor de risc
- B o cauza este dezvoltarea inadecvata a acetabulului în uter
- C oligohidramniosul reprezinta un factor de risc
- D sexul feminin este un factor de risc
- E pliurile tegumentare sunt asimetrice

15 Accidentul vascular cerebral în teritoriul arterei cerebrale medii stangi se poate traduce clinic prin:
A hemipareza stanga predominant la nivelul membrului inferior
B sindrom Horner ipsilateral
C ataxia membrelor cu hipoestezie controlaterală spino-talamică
D hemipareză dreaptă predominant facio-brahială
E hemisindrom motor, senzitiv sau senzitivo-motor

16 “Uruitura diastolică" din stenoza mitrală:
A se termină cu "clacmentul de deschidere"
B se ascultă cel mai bine în inspir
C are accentuare presistolică la pacientii cu fibrilație atrială
D este cunoscută sub numele de suflu Graham-Steell
E are tonalitate joasă

17 Aspectul radiografic (radiografie standard) al osteomului osteoid este descris astfel:
A zona radiotransparenta bine demarcată care poate contine arii de calcificari
B leziune radiotransparenta permeativa, cu zone dense de calcificari
C zona radiotransparenta < 1 cm, înconjurata de o zonă, densă de scleroză
D leziune slab delimitata, distructiva, radiotransparenta
E leziune osoasa distructiva; aspect de "bulb de ceapa" prin straturi de neoformatie osoasa periostala

18 Treapta GOLD 3, de obstructie severa a cailor aeriene in BPOC, este definita prin:
A VEMS/CVF > 0,70
B VEMS postbronhodilatator < 50% și mai mare sau egal cu 30% din prezis
C VEMS postbronhodilatator < 30% din prezis
D factorul de transfer gazos al monoxidului de carbon scazut
E asocierea insuficientei respiratorii

19 Semnul Rovsing din cadrul examenului clinic al apendicitei acute consta în:
A durere la rotirea pasiva a șoldului drept flexat
B durere in cadranul inferior drept la palparea cadranului inferior stang
C durere la extensia șoldului drept
D durere în punctul situat la o treime din distanta de la spina iliaca antero-superioara pana la ombilic
E durere la examenul rectal și/sau pelvin

20 Pentru diagnosticul hipertensiunii arteriale de gradul 2, valorile prag ale tensiunii arteriale (TA) in cabinet (mmHg) sunt:
A TA sistolică 140-159
B TA sistolică 160-179
C TA sistolică > 180
D TA diastolică 80-89
E TA diastolică > 110



Restul de 180 de întrebări, cu grila oficială și explicații, gratuit pe potide10.ro

Le rezolvi online și vezi pe loc răspunsul corect și de ce.

potide10.ro/rezidentiat/subiecte-medicina-2021/

Scanează cu telefonul