

Rezidențiat · 14 mai 2023

Subiecte rezidențiat mai 2023 medicină: primele 20 de întrebări

Primele 20 de întrebări din caietul de concurs, din pozele candidaților.

Toate cele 200 de întrebări, cu grila oficială și explicații, gratuit

potide10.ro/rezidentiat/subiecte-medicina-2023-mai/

COMPLEMENT SIMPLU: 1-50 · COMPLEMENT MULTIPLU: 51-200

1. Cea mai utilă măsură terapeutică în bronhopneumopatia obstructivă cronică (BPOC) este:
   - A folosirea regulată a unui anticolinergic cu durată lungă de acțiune
   - B vaccinarea antigripală
   - C oprirea fumatului
   - D oxigenoterapia 12-15 ore/zi
   - E folosirea teofilinei retard

2. Care dintre afirmațiile referitoare la tratamentul trombembolismului venos (TEV) este adevărată:
   - A tratamentul anticoagulant cu edoxaban și dabigatran nu necesită anticoagulare parenterală precedentă
   - B Warfarina și anticoagulante orale directe (DOAC) pot fi administrate în timpul sarcinii
   - C DOAC poate fi administrat la femei care alăptează
   - D heparina cu greutate moleculară mică (LMWH) reprezintă tratamentul de elecție asociat cancerului activ
   - E apixabanul și rivaroxabanul nu se recomandă în tratamentul TEV

3. Găsiți răspunsul corect referitor la scarlatină:
   - A se va trata ca și faringită streptococică, cu antibiotice (penicilină sau amoxicilină)
   - B este cel mai frecvent motiv de administrare a antibioterapiei la copil
   - C laboratorul nu este necesar; diagnosticul este clinic
   - D este complicată cu mastoidită și abces temporal
   - E incidența este scăzută datorită profilaxiei standard oferită la naștere

4. Despre hernia hiatală este adevărat că:
   - A cel mai comun este tipul I (de alunecare)
   - B tipul II (paraesofagiană) este cu alunecarea joncțiunii gastro-esofagiene în torace
   - C tipul I este cu conservarea intraabdominală a joncțiunii gastro-esofagiene
   - D tipul I este rar asociat cu boala de reflux gastroesofagian (BRGE)
   - E scanarea computer tomograf (CT) este standardul de aur pentru identificarea herniei hiatale

5. Afirmația corectă privind sindromul de dumping tardiv este:
   - A debutul este la 15-30 de minute după o masă hiperosmolară
   - B simptomele abdominale constau în borborisme și diaree
   - C apar simptome vasomotorii de tip senzație de foame, transpirații, palpitații, fatigabilitate, dificultăți de concentrare
   - D multiplicarea bacteriană poate provoca deconjugarea sărurilor biliare și poate duce la steatoree
   - E tratamentul constă în administrarea de antibiotice cu spectru larg

6. Care dintre următorii indicatori ai cetoacidozei diabetice severe este corect:
   - A pH venos sau arterial normal
   - B gaura anionică < 10
   - C tensiunea arterială peste 120 mmHg
   - D cetonemie peste 6 mmol/L
   - E nivelul bicarbonatului peste 5 mmol/L

7 Una dintre următoarele opțiuni de tratament pentru insuficiență cardiacă sistolică stadiul B (boli cardiace structurale, fără simptome) este adevărată:

A resincronizare cardiacă dacă este prezent blocul de ramură
B inhibitor de enzimă de conversie a angiotensinei (IECA) sau antagoniști ai receptorului de angiotensină II (ARA) la toți pacienții
C antagoniști de aldosteron
D agenți inotropi
E chirurgie de valvă mitrală

8 Dolutegravir face parte din următoarea clasă de medicamente antiretrovirale:

A inhibitori de revers-transcriptază nucleozidici/nucleotidici (INRT)
B inhibitori de integrază (INSTI)
C inhibitori de protează (IP)
D inhibitori CCR5
E inhibitori de fuziune

9 A doua cea mai frecventă localizare a tuberculozei (TB), după cea pulmonară, este:

A cutanată
B pericardică
C osoasă și vertebrală
D ganglionilor limfatici
E TB miliară

10 Sifilisul este cauzat de:

A Neisseria gonorrheae
B spirocheta Treponema pallidum
C Chlamydia trachomatis
D virusurile papilloma umane (HPV)
E virus Herpes Simplex

11 Alegeți răspunsul corect despre polipii colorectali:

A adenomul tubular are potențial malign ridicat
B sunt de obicei simptomatici
C adenomul vilos are potențial malign scăzut
D sunt detectați cel mai frecvent în timpul urmăririi colonoscopice de rutină
E hamartoamele sunt frecvente

12 Cea mai comună cauză de șoc după traumatisme este:

A șocul cardiogenic
B șocul neurogenic
C hemoragia
D tamponada cardiacă
E șocul obstructiv

13 Principala cauză a bolii de reflux gastroesofagian (BRGE) este:

A refluxul de acid gastric, pepsină, bilă și conținut duodenal în esofag
B relaxarea sfincterului esofagian inferior la inițierea deglutiției
C modificarea mucusului gastric
D secreția crescută de gastrină
E sinteza de citokine

14 Tumorile Klatskin sunt reprezentate de:
- A tumori de colecist
- B tumori perihilare
- C tumori periampulare
- D hepatocarcinom
- E tumori cefalopancreatice

15 Mioză este caracteristică intoxicației cu:
- A nicotină
- B marijuana
- C opioizi
- D amfetamine
- E alcool

16 Diagnosticul de endocardită infecțioasă, bazat pe criteriile DUKE modificate este cert atunci când:
- A există regurgitare valvulară nou documentată + febră >38°C
- B dehiscența parțială de proteză nou documentată + noduli Osler + factor reumatoid
- C se izolează un microorganism într-o cultură din vegetație
- D masă intracardiacă cu mobilitate proprie pe valvă + glomerulonefrită
- E leziune cardiacă predispozantă + embolii arteriale majore + anevrisme micotice

17 Cea mai frecventă cauză de obstrucție a lumenului apendicular este:
- A acumularea de mucus (mucocel)
- B acumularea de materii fecale (fecaliți)
- C hiperplazia limfoidă
- D carcinomul bazei apendicelui
- E strangularea într-o hernie Amyand

18 Următorul element nu face parte din scorul Bishop, utilizat pentru aprecierea posibilității nașterii pe cale vaginală după inducerea travaliului:
- A dilatația colului uterin
- B scurtarea și ștergerea colului uterin
- C stația fetală
- D consistența colului uterin
- E placenta previa

19 Inhibitorii anhidrazei carbonice, ca diuretice:
- A sunt utilizați rareori, cu excepția tratamentului glaucomului
- B sunt diuretice puternice
- C determină ototoxicitate
- D au ca efect nedorit scăderea toleranței la glucoză
- E sunt utilizați în special ca agenți economisitori ai potasiului

20 Ligamentul gastrohepatic (omentul mic):
- A este localizat pe suprafața posterioară a ficatului în proximitatea venei cave inferioare
- B atașează ficatul de diafragm împreună cu ligamentul falciform
- C atașează ficatul de peretele abdominal anterior împreună cu ligamentul coronar
- D se extinde de la nivel hepatic la mica curbură a stomacului și prima porțiune a duodenului
- E împarte ficatul în ficat stâng și ficat drept



Restul de 180 de întrebări, cu grila oficială și explicații, gratuit pe potide10.ro

Le rezolvi online și vezi pe loc răspunsul corect și de ce.

potide10.ro/rezidentiat/subiecte-medicina-2023-mai/

Scanează cu telefonul