

Rezidențiat · 17 noiembrie 2024

Subiecte rezidențiat 2024 medicină, caietul D: primele 20 de întrebări

Primele 20 de întrebări din caietul de concurs, din pozele candidaților.

Toate cele 200 de întrebări, cu grila oficială și explicații, gratuit

potide10.ro/rezidentiat/subiecte-medicina-2024/

COMPLEMENT SIMPLU: 1-50 · COMPLEMENT MULTIPLU: 51-200

1. Pragul auditiv normal este:
   - A 0-20 dB
   - B 25-40 dB
   - C 40-70 dB
   - D 70-90 dB
   - E >90 dB

2. Diagnosticul și tratamentul displaziei de dezvoltare a șoldului includ:
   - A semnul Ortolani constă în perceperea unui cracment în timpul manevrei de luxație a șoldului
   - B testul Barlow este util după prima lună de viață
   - C manevra de provocare a luxației se face prin adducție și flexia coapsei sugarului
   - D imobilizarea se efectuează într-o poziție de flexie și adducție
   - E radiografia este utilă în primele 9 luni de viață

3. Care dintre următoarele analize de laborator poate fi test screening pentru tromboza venoasă profundă?
   - A antitrombina III
   - B factorul V Leiden
   - C D-dimerii
   - D anticorpii anti-cardiolipină
   - E mutația genei protrombinei

4. Clasificarea arsurilor în funcție de profunzime include:
   - A arsurile de grad I se extind în derm fără a-l depăși
   - B arsurile de profunzime parțială superficială sunt caracterizate de absența flictenelor
   - C arsurile profunde determină plăgi acoperite de escară avasculară, nedureroasă
   - D arsurile epidermale sunt caracterizate de apariția flictenelor formate din epiderm
   - E arsurile de grad II sunt arsuri profunde în toată grosimea

5. Riscul teratogen caracteristic administrării dietilsilbestrolului (DES) în cursul sarcinii este apariția:
   - A defectelor de tub neural
   - B anomaliilor faciale
   - C anomaliilor cardiovasculare
   - D anomaliilor scheletului
   - E cancerului vaginal și de col uterin, ulterior în viață

6. Cu privire la dinamica echilibrului sodiului (Na+), care dintre următoarele afirmații este adevărată?
   - A expansiunea VASE (volumul arterial sanguin efectiv) determină scăderea excreției urinare a sodiului
   - B la subiecții normali, doze ridicate de mineralocorticoizi scad inițial retenția de sodiu
   - C dacă hipovolemia se accentuează, scăderea RFG (rata de filtrare glomerulară) va duce la scăderea reabsorbției sodiului la nivel proximal și în ansa ascendentă
   - D principalul determinant al excreției renale de sodiu și apă este starea de plenitudine a VASE
   - E pompa de sodiu/potasiu determină distribuția preponderentă a sodiului în lichidul intracelular

7. La un pacient cu diabet zaharat, petele de vată evidențiate la examenul de fund de ochi sunt cauzate de:
   - A lezarea pereților vaselor mici
   - B breșe ale pereților vasculari
   - C depozite proteice și lipidice rămase după drenarea fluidelor retiniene
   - D microinfarcte retiniene secundare ocluziei vaselor
   - E depășirea capacității de eliminare a scurgerilor vasculare din regiunea maculară

8 Precizați care dintre tipurile de proceduri bariatrice induc pierderea ponderală prin mecanism combinat între malabsorbție și restricție:

A bandarea gastrică ajustabilă
B diversia biliopancreatică
C gastrectomia longitudinală
D bypass-ul gastric Roux-en-Y
E diversia biliopancreatică cu switch duodenal

9 Care dintre următoarele afirmații referitoare la chemoprofilaxia antibiotică este adevărată?

A profilaxia cu antibiotice este recomandată pentru prevenirea endocarditei la pacienții care urmează proceduri la nivelul tractului gastrointestinal superior și inferior
B pacienții cu proteze valvulare cardiace necesită întotdeauna tratament profilactic cu antibiotic
C tratamentul antibiotic profilactic este recomandat în chirurgia colonului
D profilaxia cu antibiotice pentru majoritatea intervențiilor chirurgicale trebuie să depășească 24 de ore postprocedural
E profilaxia meningitei meningococice se realizează cu rifampicină 600 mg doză dublă zilnică pentru 4 zile

10 Ce este mezorectul?

A mezenterul propriu al rectului
B prelungirea anterioară a fasciei endopelvine (Waldeyer) care separă rectul de prostată
C grupul ganglionar situat de-a lungul vaselor hemoroidale mijlocii
D valva rectală mijlocie Houston
E țesutul adipos perirectal, delimitat de o fascie

11 În nefropatia cu leziuni minime:

A glomerulii apar normali în microscopia optică
B nu apar remisiuni spontane
C proteinuria este în mod caracteristic neselectivă
D rata de răspuns la tratament este mai mică la copii decât la adulți
E antihelminticul levamisol este utilizat la toți pacienții în terapia de inducție

12 În politraumatisme, hemoragia din clasa II se caracterizează prin:

A frecvență cardiacă > 100 bătăi/min
B frecvență respiratorie >35 respirații/min
C pierderea de sânge la o persoană de 70 kg este de 1500-2000 ml
D timpul de umplere capilară este normal
E volumul de sânge pierdut este de 30-40%

13 Care aspect clinic și imagistic este util în diagnosticul osteomielitei acute?

A debutul este lent
B modificările radiologice sunt precoce și sugerează diagnosticul
C scintigrafia osoasă nu poate face diferența între celulită și osteomielită acută în fază incipientă
D în caz de septicemie poate apărea febra
E numărul de leucocite este scăzut

14 Care dintre următoarele afirmații referitoare la angina refractară este adevărată?

A este angina cu debut recent (< 24 de ore) sau agravarea anginei stabile
B apare în repaus ca rezultat al spasmului coronarian
C apare la pacienții cu angină de efort în lipsa stenozelor coronariene semnificative
D revascularizarea miocardică nu este realizabilă
E administrarea de acetilcolină intracoronarian poate determina spasm coronarian

15 În funcție de nivelul de contaminare, plaga chirurgicală după rezecția electivă a colonului este:

A plagă curată
B plagă murdară
C plagă curat-contaminată
D plagă contaminată
E plagă cu germeni gram-pozitivi

16 Tratamentul anticoagulant electiv la femeile gravide este reprezentat de:

A antagoniștii vitaminei K
B heparinele cu greutate moleculară mică
C inhibitorii direcți ai trombinei
D inhibitorii direcți ai factorului Xa
E colagenul microfibrilar

17 Infecția maternă cu Streptococ de grup B poate determina asupra nou- născutului:

A leziuni ale pielii dând aspect de "bebeluș ca o brioșă cu afine"
B meningită
C corioretinită
D calcificări intracraniene
E diabet zaharat

18 Care dintre următoarele afirmații referitoare la fracturi și diformități osoase este adevărată?

A genu varum sau "picioarele în X" apare când vârful angulării diformității este îndepărtat de linia mediană
B genu valgum sau "picioarele în paranteză" se produce când vârful angulării este îndreptat către linia mediană
C termenii de varus și valgus pot fi folosiți în descrierea fracturilor
D tratamentul genunchiului în varus necesită o osteotomie femurală
E la adulți se poate observa o încurbare incompletă cunoscută sub numele de fractură în lemn verde

19 Antiaritmicele de clasă III acționează prin:

A reducerea influxului de sodiu în celulă
B prelungirea potențialului de acțiune prin blocarea componentei rapide a curentului de potasiu
C încetinirea conducerii la nivelul nodului atrio-ventricular
D antagonizarea receptorilor beta-adrenergici
E efect antiischemic

20 Cea mai frecventă formă de prezentare a tumorilor carcinoide intestinale este:

A sindromul carcinoid
B hemoragia intestinală
C masa tumorală palpabilă
D perforația
E ocluzia



Restul de 180 de întrebări, cu grila oficială și explicații, gratuit pe potide10.ro

Le rezolvi online și vezi pe loc răspunsul corect și de ce.

potide10.ro/rezidentiat/subiecte-medicina-2024/

Scanează cu telefonul